



AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Bulletins techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n° 6 du 03 Juin 2005
Rédigé en collaboration avec la Ferme Expérimentale de Loudes et la Chambre d'Agriculture

Grandes Cultures

CEREALES

Ces cultures sont au stade grain aqueux ou fin floraison pour les tardifs.

Fusarioses des épis: selon les dates de floraison et la sensibilité variétale les attaques seront sans doute très variables. Quelques épillets atteints sont visibles dans nos essais (témoins). Les traitements recommandés en début floraison auront permis de limiter les contaminations.

Septoriose: présente également mais limitée aux F3 et plus rarement sur F2.

Rouille brune: depuis cette semaine on constate une forte présence de la rouille voire une explosion sur beaucoup de variétés (parcelles isorisques et témoins non traités). Les pustules peuvent se compter par centaines surtout sur F1.

Les traitements de début floraison assurent une bonne protection. En leur absence une intervention est indispensable mais devient inutile à partir du stade laiteux.

Oïdium: toujours présent jusqu'aux étages supérieurs. Les barbes et les épis des plantes plus basses sont atteints (toujours en parcelles non protégées).

Pucerons: ils sont par endroits nombreux sur les épis et parfois au delà du seuil d'intervention (1 épi sur 2 colonisé). Toutefois un traitement ne peut être envisagé que jusqu'au stade laiteux (spécialité associant pyrèthrine et pyrimicarbe).

POIS

Cultures en cours de maturité, quelques rares fin floraison.

Pucerons: très nombreux mais une protection a dû être effectuée.

Si ce n'est le cas intervenez rapidement dès lors que vous constatez leur présence par dizaine en secouant des plantes.

Maladies: plus d'intervention sauf en parcelles tardives non encore protégées en fin floraison. Prendre en compte le risque oïdium de fin de cycle.

COLZA

Ces cultures sont en pleine maturité, l'oïdium et les ravageurs sont restés assez discrets. Sur oïdium une intervention, si vraiment nécessaire, ne doit pas être effectuée à moins de 3 semaines de la récolte.

TOURNESOL

Stades variables, de 4-6 feuilles à 8-10 feuilles.

Phomopsis: le potentiel et le risque sont faibles; le modèle n'indique pas de contaminations notables. Les tolérances variétales actuelles protègent les cultures. Seules les "peu sensibles" (en l'absence de "sensibles") peuvent bénéficier d'un traitement en limite passage de tracteur limité à des situations très favorables (bas fonds par exemple).

MAIS (hors semence)

Les maïs sont actuellement pour la plupart à 6-8 feuilles.

Vers gris: dans certaines parcelles des manifestations notables de leur activité sont visibles.

Sésamie: le vol est en cours (selon le modèle en données cumulées). Les premiers stades baladeurs devraient intervenir vers le 10 juin. Le risque en terme de

sésamie paraît très minime suite au froid hivernal.

Pyrale: Le vol se situe actuellement autour de 10% et son pic devrait intervenir entre le 10 et le 15 juin. La pression de ce ravageur est plus importante ces dernières années par rapport à la sésamie. L'activité pyrale et surtout les pontes vont beaucoup dépendre, comme d'habitude du niveau de la pluviométrie à venir sur juin.

Pucerons: leur présence reste encore négligeable d'autant qu'ils ont été peu nombreux sur les céréales jusqu'à maintenant.

Cicadelles: on voit déjà les manifestations de leur présence par les piqûres alimentaires sur les feuilles et par leurs mouvements. L'absence de l'enrobage des semences explique cette présence précoce par rapport aux années antérieures.

CEREALES: cultures normalement protégées à la floraison. A noter la forte présence de rouille (en l'absence de traitements) et de pucerons.

POIS: cultures normalement protégées à la floraison. Pucerons en extension.

TOURNESOL: risque phomopsis limité et variétés tolérantes.

MAIS: traitement de protection contre les ravageurs (Pyrale, Sésamie, Cicadelles, Pucerons) à réaliser au 10 juin.

DRAF
Service Régional de la
Protection des
Végétaux
ZAC D'ALCO-BP3056
34034 MONTPELLIER
CEDEX 01
Tél: 04.67.10.19.50
Fax: 04.67.03.10.21

Antenne Carcassonne
Chemin de la Jasso
Plaine Mayrevielle
31000 CARCASSONNE
Tél: 04.68.71.18.58
Fax: 04.68.47.46.45

Imprimé à la station
d'Avertissements
Agricoles de Languedoc
Roussillon
Directeur gérant:
M. LARGUIER
Publication périodique
C.P.A.P. N° 531 AD
ISSN N° 0298-6582

23 5° 50 51598

7118